



Was Sie über Intimchirurgie wissen sollten

Für einige Frauen gibt es medizinische und ästhetische Gründe, sich den Intimbereich korrigieren zu lassen. Die idealen inneren Schamlippen werden von den äußeren Schamlippen bedeckt. Sind die inneren Schamlippen zu groß oder deformiert, hängen sie nach unten und sind teils deutlich sichtbar. Die Frauen haben häufig Hemmungen sich nackt zu zeigen, was unter anderem auch zu Störungen des Sexuallebens führen kann. Ziel unserer Operation sind möglichst symmetrische Schamlippen.

Was geschieht bei der Operation?

Bei der Verkleinerung wird vor dem Eingriff die zu entfernende Hautmenge zuvor exakt vermessen, eingezeichnet und dann entfernt. Die Haut wird in der Regel fein mit selbst auflösbaren Fäden vernäht. Die Operation dauert 1-2 h und kann in örtlicher Betäubung oder Vollnarkose durchgeführt werden.

Was geschieht nach der Operation?

Die äußerlichen Fadenschläufchen können nach 14 Tagen entfernt werden. Die ersten 14 Tage sollte auf Sport und lange sitzende Tätigkeit verzichtet werden.

Komplikationen / Risiken

Kleine Schwellungen und Blutergüsse verschwinden wie Missempfindungen in der Regel schnell von selbst. Bei unter 5% der Patientinnen verbleibt lediglich im Nahtbereich eine asensible Region. Durchblutungsstörungen mit Untergang von Schleimhaut kommen so gut wie nie vor.

Kontakt

aesthetic medics
Sprechstunde für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
Dr. Annett Kleinschmidt

Praxis Dr. Buschmann
Wilmerdorfer Straße 62
10627 Berlin

Tel: + 49 (0) 30 8826 174
Fax: + 49 (0) 30 310125 09

praxis@aesthetic-medics.de